

КОРЬ

Это аэрозольная инфекция.
Чтобы заболеть, достаточно
побыть в одном помещении
с тем, кто уже болеет.

ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД (от момента заражения до появления симптомов) - 10-18 дней, максимально - 21 день.

Первые признаки - общее недомогание, головные боли, снижение аппетита, нарушение сна. Повышается температура до 38-40 градусов. **С первых дней болезни** отмечается насморк, сухой кашель, осиплость голоса, покраснение слизистых глаз, светобоязнь. **Затем** на слизистой рта появляются белесые пятнышки с красной каймой - характерный симптом кори. **Далее начинается** период корьевой сыпи в виде пятен - вначале на лице, затем по всему телу. Не стоит допускать до этого, надо обращаться к врачу при первых признаках недомогания. Пусть лучше корь не подтвердится!



СИМПТОМЫ

Осложнения - ларингиты, трахеобронхиты, воспаление легких, среднего уха, головного мозга, сердца, судороги, развивающиеся на фоне высокой температуры.

ЕДИНСТВЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОЙ МЕРОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ЯВЛЯЕТСЯ ИММУНИЗАЦИЯ!



Согласно Национальному календарю профилактических прививок Республики Беларусь **вакцинация против кори** проводится детям в **возрасте 12 месяцев**, ревакцинация - в **6 лет**.

Стоит ли отказываться от прививки?

Профилактическая прививка против кори является надежным, эффективным и безопасным средством профилактики заболевания. Более того, стоит посоветовать и взрослым - если сведений о прививках нет или известно только об одной прививке от кори, или вы не болели корью ранее, стоит сделать прививку, особенно собираясь ехать в другие страны, где сейчас неблагоприятная эпидемиологическая ситуация.



Если Вам стало известно, что Вы находились в контакте с заболевшим корью, то обязательно обратитесь к врачу!

Если заболели - вызывайте врача на дом!