

Полиомиелит - острое инфекционное заболевание, поражающее преимущественно центральную нервную систему с развитием парезов (ослабление двигательных функций) и параличей.

Чаще всего болеют дети от 3-6 месяцев до 7 лет, реже дети старшего возраста, но могут и взрослые.

Источником возбудителя инфекции является человек - больной или вирусоноситель. Вирус выделяется в окружающую среду фекально-оральным путем, но возможен и воздушно-капельный путь передачи возбудителя; он обнаруживается также в слизистом выделяемом носоглотки, в сточных водах. Вирус полиомиелита сохраняется длительно в воде, молоке, но при кипячении в течение 10-12 минут погибает.

Заражение вирусом полиомиелита относительно редко ведет к развитию типичного заболевания, чаще возникает вирусоносительство, которое имеет основное значение в распространении полиомиелита. Этому же способствуют сточные воды и загрязненные источники водоснабжения. Наиболее часто заболевания полиомиелитом встречаются летом и осенью.

Излечить полностью полиомиелит невозможно, но его можно предотвратить. Полиомиелитная вакцина, привитая несколько раз, может защитить ребенка на всю жизнь.

В 1988 году Всемирная организация здравоохранения приняла программу ликвидации полиомиелита во всем мире. Благодаря осуществлению этой программы три миллиона детей в разных странах избежали паралитической болезни и ходят сегодня по

земле лишь потому, что были вакцинированы против полиомиелита.

Профилактические мероприятия

- Обязательно своевременно прививать ребенка в детской поликлинике против полиомиелита, когда ему исполнится: 2 месяца, 3 месяца, 4 месяца и 7 лет.

- Если у ребенка возникли **жалобы на нарушение походки, опоры на ноги, снижение мышечной силы в ноге или руке, он стал часто спотыкаться, "тянуть" ногу, "шлепать" ею и т.п., то следует немедленно проконсультировать ребенка у детского невропатолога.**



Вышеуказанные симптомы могут возникнуть в сочетании с другими клиническими проявлениями (повышение температуры, расстройство стула и др.), после внутримышечных инъекций любых лекарственных препаратов, прививок, а также без видимых причин.

С целью профилактики полиомиелита необходимо:

- соблюдать правила личной гигиены (мытьё рук)
- свежие овощи, фрукты, сухофрукты и зелень перед употреблением после мытья под проточной водой сполоснуть кипяченой водой.

- для питья использовать только бутилированную или кипяченую воду, напитки, соки промышленного производства

- запрещается покупать лед для охлаждения напитков у продавцов уличной торговли, а также использование в пищу продуктов традиционной национальной кухни, продуктов с просроченным сроком годности, не прошедших гарантированную технологическую обработку, а также приобретенных в местах уличной торговли;

- прием пищи допускается в определенных пунктах питания, где используются продукты гарантированного качества промышленного производства.

*Министерство здравоохранения Республики Беларусь
ГУ «Дзержинский районный центр гигиены и
эпидемиологии»»*

ПОЛИОМИЕЛИТ



2021г.